

ОДОБРЕНО

Совет по ветеринарным препаратам

Протокол от «24» 06 2022 г. № 121

ИНСТРУКЦИЯ

по применению препарата ветеринарного «АМОКСИФАРМ 20%»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Амоксифарм 20% (Amoxipharmum 20%).

Международное непатентованное наименование активной фармацевтической субстанции: амоксициллин.

1.2 Амоксифарм 20% - противомикробный препарат, представляющий собой порошок от белого до желтого цвета.

Лекарственная форма: порошок для орального применения.

В 1,0 г препарата содержится 200 мг амоксициллина тригидрата; наполнитель (декстроза моногидрат).

1.3 Препарат выпускают в пакетах из полимерных материалов по 50, 100, 200, 500 г, 1 кг и мешках из бумаги и комбинированных материалов по 3, 5, 10, 20, 25 кг.

1.4 Амоксифарм 20% хранят по списку Б в упаковке изготовителя в сухом, защищенном от света помещении при температуре от 0°C до плюс 25°C.

Срок годности - 2 (два) года от даты изготовления при условии соблюдения правил хранения.

1.5 Препарат применяют по назначению ветеринарного врача. Не применять по истечении срока годности. Хранить в местах недоступных для детей.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Амоксициллин – полусинтетический антибиотик из группы пенициллина, обладает широким спектром противомикробного действия. К амоксициллину чувствительны *Staphylococcus spp.*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Corynebacterium spp.*, *Clostridium spp.*, *Campylobacter spp.*, *Brucella spp.*, *Salmonella spp.*, *Escherichia coli*, *Haemophilus spp.*, *Bacteroides spp.*, *Fusobacterium necrophorum*, *Proteus spp.* и другие.

2.2 Механизм действия препарата заключается в нарушении синтеза клеточной стенки бактерии путем ингибирования ферментов транспептидазы и карбоксипептида

3.4 Запрещается совместное применение препарата с сульфаниламидами, антибиотиками групп тетрациклина, амфеникола, макролидами и линкозамидами.

Препарат запрещен к применению птицам-несушкам, чье яйцо используется в пищу людям.

3.5 При применении препарата возможны аллергические реакции. При наличии побочных эффектов применение препарата прекращают, назначают антигистаминные препараты и препараты кальция.

3.6 Убой животных, птиц на мясо разрешается через 15 суток после последнего применения препарата. В случае вынужденного убоя ранее этого срока мясо может быть использовано на корм плотоядным животным.

4 МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 При работе с препаратом соблюдают общие правила личной гигиены и техники безопасности.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которой он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного или несоответствии препарата по внешнему виду, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, составляется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (220005, г. Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения соответствия препарата нормативной документации.

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1 Общество с ограниченной ответственностью «Ветинтерфарм» (ООО «Ветинтерфарм»). Юридический адрес: 223060, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. 91-29, район д. Большой Тростенец. Адрес производства: 223070, Минский р-н, поселок Михановичи, ул. Заводская, д.5.

Инструкция по применению ветеринарного препарата «Амоксифарм 20%» подготовлена сотрудниками кафедры фармакологии и токсикологии (И.А. Ятусевич, В.В. Петров), эпизоотологии (В.В. Максимович), внутренних незаразных болезней животных (В.Н. Иванов) УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» и ООО «Ветинтерфарм» (В.М.Романюк).

