



для ветеринарного применения  
лекарственного препарата

## Альпомаст™ Цефти DC

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: Альпомаст™ Цефти DC (Alpomast Ceftri DC).

Международное непатентованное наименование: цефтиофур.

2. Лекарственная форма: суспензия для интрацестерального введения.

Альпомаст™ Цефти DC содержит в одном в шприце-дозаторе в качестве действующего вещества цефтиофур (в форме цефтиофура гидрохлорида) – 0,5 г; а в качестве вспомогательных веществ - алюминия стеарат и масло соевое.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой гомогенную суспензию от белого до бледно-желтого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 3 года от даты производства.

Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

4. Альпомаст™ Цефти DC выпускают в виде стерильной суспензии, расфасованной по 10 мл в одноразовые полиэтиленовые шприцы-дозаторы, укупоренные полиэтиленовыми колпачками. Каждый шприц-дозатор снабжен антисептической салфеткой. Шприцы-дозаторы упакованы по 24 штуки в картонные коробки. На этикетке упаковки ветеринарного препарата указывается следующая информация: торговое наименование ветеринарного препарата; международное непатентованное наименование; лекарственная форма; дозировка активных фармацевтических субстанций; количество ветеринарного препарата в упаковке; путь введения; наименование производителя и держателя регистрационного удостоверения ветеринарного препарата; номер серии; дата истечения срока годности («годен до...»), надписи: «Стерильно», «Для животных». Каждую единицу потребительской упаковки снабжают инструкцией по применению.

5. Лекарственный препарат хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5 °С до 25 °С.

6. Альпомаст™ Цефти DC следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

### II. Фармакологические свойства

9. Альпомаст™ Цефти DC относится к антибактериальным лекарственным препаратам группы цефалоспоринов.

10. Цефтиофура гидрохлорид, входящий в состав лекарственного препарата, является цефалоспориновым антибиотиком третьего поколения, который обладает широким спектром бактерицидного действия в отношении грамположительных (в том числе Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Arcanobacterium spp., Fusobacterium spp.) и грамотрицательных бактерий (в том числе E. coli, Salmonella spp., Haemophilus spp., Campylobacter spp., Klebsiella spp., Shigella spp.), включая штаммы бактерий, продуцирующие β-лактамазу и некоторые анаэробные бактерии.

Механизм бактерицидного действия цефтиофура заключается в ингибировании функциональной активности бактериальных ферментов транспептидаз, участвующих в

связывании основного компонента клеточной стенки микроорганизмов – пептидогликана, что приводит к нарушению осмотического баланса и разрушению бактериальной клетки.

После введения цефтиофур поступает в системный кровоток, интенсивно метаболизируется с образованием десфуроилцефтиофура, который обладает эквивалентной цефтиофуру активностью в отношении микроорганизмов. Данный метаболит обратимо связывается с белками плазмы и накапливается в очаге воспаления. Активность цефтиофура не снижается в присутствии некротизированных тканей. Выводится цефтиофур и его метаболиты из организма животного преимущественно с мочой и в меньшей степени с желчью.

Альпомаст™ Цефти DC в рекомендованных дозах не оказывает местно-раздражающего действия на ткани вымени.

### **III. Порядок применения и дозировка**

11. Альпомаст™ Цефти DC применяют для лечения мастита бактериальной этиологии у коров в сухостойный период, но не позднее 30 дней до предполагаемого отела.

12. Противопоказанием для применения лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к цефалоспорином.

13. При работе с препаратом Альпомаст™ Цефти DC следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Любям с гиперчувствительностью к компонентам лекарственного препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Альпомаст™ Цефти DC.

Все работы с препаратом Альпомаст™ Цефти DC необходимо проводить с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты (резиновые перчатки, защитные очки, респиратор). Во время работы с лекарственным препаратом запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть с мылом руки и лицо. При случайном попадании лекарственного препарата в глаза, на кожу или слизистые оболочки его необходимо немедленно смыть большим количеством проточной воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению лекарственного препарата или этикетку).

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей; она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Альпомаст™ Цефти DC не предназначен для применения в период лактации. Разрешается применение лекарственного препарата сразу после завершения периода лактации перед переводом в сухостойный период, но не позднее 30 суток до предполагаемого отела, в связи с выделением цефтиофура с молоком.

15. Альпомаст™ Цефти DC вводят коровам однократно, интрацистернально, сразу после завершения периода лактации, в дозе 10 мл (содержимое одного шприца-дозатора) в пораженную четверть вымени.

Перед введением препарата Альпомаст™ Цефти DC необходимо выдоить молоко из поражённой доли вымени. Сосок снаружи обрабатывают дезинфицирующей салфеткой, поставляемой с лекарственным препаратом, или дезинфицирующим средством. После этого канюлю шприца-дозатора аккуратно вводят в канал соска и медленно с осторожностью выдавливают содержимое в поражённую долю вымени.

Затем, канюлю извлекают, верхнюю часть соска пережимают на 1-2 минуты, после чего пальцами массируют сосок снизу вверх.

16. Побочных явлений и осложнений при применении препарата Альпомаст™ Цефти DC в соответствии с настоящей инструкцией как правило не наблюдается. В случае появления аллергических реакций использование лекарственного препарата прекращают и назначают антигистаминные средства и другое симптоматическое лечение.

17. Симптомы передозировки не установлены.

18. Не следует применять Альпомаст™ Цефти DC совместно с другими лекарственными препаратами для интерцистернального введения, а также с другими лекарственными препаратами группы аминогликозидов, тетрациклиновой группы, а также фуросемидом и этакридиновой кислотой из-за возможного усиления нефротоксического эффекта.

19. Особенности действия при первом приеме лекарственного препарата и его отмене не выявлено.

20. Альпомаст™ Цефти DC предназначен для однократного применения.

21. Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 3 суток после введения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей.

Молоко от коров после отела при применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией используется без ограничений.

22. Организация-разработчик: ALPOVET LTD, Кипр.

Произведено: по заказу ALPOVET LTD, Кипр.