

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Пецивета для лечения болезней
бактериальной этиологии у свиней

(организация –разработчик «Ветеллас S.A.», Греция)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Пецивет (Pecivet).

Международное непатентованное наименование: феноксиметилпенициллин.

2. Лекарственная форма: порошок для орального применения.

Пецивет в качестве действующего вещества в 1 г содержит феноксиметилпенициллин - 100 мг, а в качестве вспомогательных веществ минеральное масло – 5 мг и кальция карбонат - до 1 г. Лекарственный препарат представляет сыпучий порошок серого цвета.

3. Пецивет выпускают расфасованным по 1000 и 3000 г в полиэтиленовые пакеты и по 5, 10 и 25 кг в бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым слоем. Каждую единицу упаковки снабжают инструкцией по применению.

4. Пецивет следует хранить в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0° С до 25° С.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 2 года с даты производства.

Запрещается применение Пецивета по истечении срока годности.

5. Лекарственный препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Пецивет относится к антибактериальным препаратам группы пенициллинов.

Феноксиметилпенициллин – действующее вещество Пецивета - активен преимущественно в отношении грамположительных и некоторых грамотрицательных бактерий (*Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Clostridium* spp., *Corynebacterium* spp., *Erysipelothrix* spp., *Listeria* spp., *Pasteurella* spp., *Actinobacillus* spp., *Campylobacter* spp., *Bacillus anthracis*).

Механизм бактерицидного действия феноксиметилпенициллина заключается в подавлении функциональной активности бактериальных ферментов транспептидаз,

участвующих в связывании основного компонента клеточной стенки микроорганизмов – пептидогликана, что приводит к гибели бактерий.

После перорального применения препарата феноксиметилпенициллин хорошо всасывается в желудочно-кишечном тракте и проникает в большинство органов и тканей, терапевтические концентрации препарата поддерживаются на протяжении 4-6 часов. Феноксиметилпенициллин выводится из организма преимущественно в неизмененном виде с мочой.

Пецивет по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

8. Пецивет применяют для лечения бактериальных инфекций свиней, вызванных чувствительными к феноксиметилпенициллину микроорганизмами.

9. Противопоказанием к применению Пецивета является повышенная индивидуальная чувствительность животного к бета-лактамам антибиотикам. Не следует применять лекарственный препарат животным с выраженной почечной недостаточностью.

10. Пецивет применяют свиньям с кормом групповым способом в суточной дозе 2 кг препарата на 1 тонну корма в течение 7-10 дней. Для равномерного распределения препарата рекомендуется смешать суточную дозу сначала с небольшим количеством корма, а затем полученную смесь ввести в общее количество корма, рассчитанное на потребление животными в течение суток.

Во время лечения свиньи должны получать только корм с лекарственным препаратом.

11. При значительной передозировке у животных может наблюдаться диарея, анорексия, нефротоксические эффекты.

12. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

13. Следует избегать пропуска очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.

14. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают антигистаминные лекарственные средства и симптоматическое лечение.

15. Не рекомендуется одновременно назначать феноксиметилпенициллин и бактериостатические антибиотики, так это может привести к снижению эффективности лечения; одновременный прием ацетилсалициловой кислоты и индометацина может увеличивать период выведения феноксиметилпенициллина из организма животных.

16. Убой свиней на мясо разрешается не ранее, чем через 3 суток после последнего применения Пецивета. Мясо свиней, вынужденно убитых ранее установленных сроков, может быть использовано после тепловой обработки в корм пушным зверям.

IV. Меры личной профилактики

17. Все работы с Пециветом рекомендуется проводить с использованием средств индивидуальной защиты (спецодежда, резиновые перчатки, защитные очки, респиратор). Во время работы с препаратом запрещается пить, курить и принимать

пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть с мылом лицо и руки, рот прополоскать водой.

18. Людям с гиперчувствительностью к бета-лактамам следует избегать прямого контакта с Пециветом. При случайном попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его необходимо тотчас смыть проточной водой с мылом. В случае появления аллергических реакций и/или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей; она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель «Vethellas S.A.», - 31 August Str. 51, 41221 Larisa, Greece.