

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата
Фармкэя-Хлортетрациклин 20%

(Организация-разработчик: Zhumadian Huazhong Chia Tai Co. Ltd., Китай)

Номер регистрационного удостоверения: №РК-ВП-4-5255-24

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: Фармкэя-Хлортетрациклин 20% (FarmCare-Chlortetracycline 20%).

Международное непатентованное название: хлортетрациклин.

2. Лекарственная форма: гранулированный порошок для перорального применения.

Фармкэя-Хлортетрациклин 20% содержит в 1 г в качестве действующего вещества хлортетрациклина гидрохлорид – 200 мг, а в качестве вспомогательных веществ продукты ферментации хлортетрациклина и карбонат кальция.

3. По внешнему виду препарат представляет собой гранулированный порошок от коричневого до темно-коричневого цвета. Срок годности Фармкэя-Хлортетрациклин 20% при соблюдении условий хранения — 2 года с даты производства.

Лекарственный препарат запрещается использовать по истечении срока годности.

4. Фармкэя-Хлортетрациклин 20% выпускают расфасованным по 25 кг в полиэтиленовых мешках, вложенных в композитные пропиленовые мешки.

Каждая потребительская упаковка сопровождается инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от света и влаги месте, при температуре от 0°C до 30 °C.

6. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Фармкэя-Хлортетрациклин 20% отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические (биологические) свойства

9. Фармкэя-Хлортетрациклин 20% относится к группе антибактериальных лекарственных препаратов группы тетрациклина.

10. Хлортетрациклин активен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе стафилококков, стрептококков, бордетелл, микоплазм, пастерелл, сальмонелл, эшерихий.

Механизм бактериостатического действия хлортетрациклина заключается в подавлении синтеза на рибосомальном уровне.

При пероральном введении антибиотик постепенно всасывается из желудочно-кишечного тракта, достигая максимальных концентраций через 4 часа после введения. При постоянном поступлении антибиотика в организм животных и птиц его концентрация поддерживается на терапевтическом уровне в течение всего периода лечения. Хлортетрациклин подвергается метаболизму в незначительной степени и выводится из организма с фекалиями и мочой.

По степени воздействия на организм Фармкэя-Хлортетрациклин 20% относится к 4 классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007-76.

III. Порядок применения

11. Фармкэя-Хлортетрациклин 20% применяют для лечения телят, ягнят, свиней, цыплят-бройлеров, ремонтного молодняка кур, индюшат при пастереллезе, колибактериозе, сальмонеллезе, бронхопневмонии, гастроэнтероколите и других болезнях бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к хлортетрациклину.

12. Противопоказанием к применению препарата является индивидуальная повышенная чувствительность к антибиотикам тетрациклинового ряда. Не допускается применение препарата животным с развитым рубцовым пищеварением, с поражениями печени.

13. При работе с лекарственным препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. При работе с препаратом запрещается курить, пить и принимать пищу. При попадании препарата на кожу или слизистые оболочки необходимо немедленно промыть их большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с ним. В случае появления аллергических реакций и/или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку). По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. К работе с препаратом не допускаются лица с признаками аллергических, респираторных, желудочно-кишечных заболеваний или кожных поражений. Пустую тару из-под препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Запрещается применение препарата беременным животным и в период лактации, а также курам-несушкам в период яйценоскости.

15. Фармкэя-Хлортетрациклин 20% применяют индивидуально или групповым способом телятам, ягнятам и свиньям с кормом в суточной дозе 100-200 мг препарата на 1 кг массы животного, разделенной на 2 приема (эквивалентно дозе 20-40 мг хлортетрациклина на 1 кг массы животного) в течение 5-10 суток. Рекомендованная норма ввода Фармкэя-Хлортетрациклин 20% в корм цыплятам-бройлерам, ремонтному молодняку кур, индюшатам составляет 1,5-3 кг на тонну корма.

В период лечения животные и птица должны получать только корм, содержащий лекарственный препарат.

16. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают антигистаминные средства и симптоматическую терапию.

17. Симптомы передозировки при применении препарата не выявлены.

18. Фармкэя-Хлортетрациклин 20% не назначают совместно с антацидами, каолином, а также препаратами, содержащими железо, магний, кальций, алюминий, антибиотиками групп пенициллина, полимиксина, макролидами.

19. Особенности действия препарата при первом применении и при его отмене не выявлено.

20. Следует избегать пропусков при применении очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.

21. Убой поросят и телят на мясо разрешается не ранее, чем через 12 суток, цыплят-бройлеров, ремонтного молодняка кур и индюшат — не ранее, чем через 10 суток после последнего применения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм пушным зверям.