



ИНСТРУКЦИЯ по ветеринарному применению лекарственного препарата **АйФлу ND+H9**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:
- торговое наименование: АйФлу ND+H9 (Yeflu ND+H9);
- международное непатентованное наименование: вакцина против ньюкаслской болезни и гриппа птиц подтипа H9 инактивированная эмульсионная.

2. Лекарственная форма: эмульсия для инъекций.

Вакцина изготовлена из экстраэмбриональной жидкости эмбрионов кур, инфицированных вирусами ньюкаслской болезни (штамм Ла-Сота) и гриппа птиц подтипа H9 (штамм A/Chicken/Shanghai/1/98/H9N2), инактивированной формальдегидом, с добавлением масляного адъюванта (минеральное масло), Спан-80, Твин-80 и алюминия стеарата.

В одной иммунизирующей дозе вакцины (0,5 мл) содержит инактивированные вирусы: ньюкаслской болезни, штамм Ла-Сота (титр вируса до инактивации, не менее $10^{8,1}$ ЭИД₅₀); гриппа птиц подтипа H9, штамм A/Chicken/Shanghai/1/98/H9N2 (титр вируса до инактивации, не менее $10^{7,1}$ ЭИД₅₀).

3. По внешнему виду вакцина представляет собой однородную эмульсию белого цвета.

Срок годности вакцины при соблюдении условий хранения и транспортирования – 24 месяца с даты выпуска. Вакцина должна быть использована сразу после вскрытия флакона. Не применять по истечении срока годности.

4. Вакцина расфасована по 500 мл (1000; 2500 доз) в стерильные пластиковые флаконы из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП), герметично укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиево-пластиковыми колпачками. Каждая упаковка снабжается инструкцией по применению.

5. Вакцину хранят и транспортируют в закрытой упаковке производителя, в защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 2°C до 8°C. Замораживание не допускается.

6. Вакцину следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Флаконы с вакциной без этикеток, с истекшим сроком годности, подвергшиеся замораживанию, с нарушением целостности и/или герметичности укупорки, с измененным цветом и/или консистенцией содержимого, с наличием посторонних примесей, а также остатки вакцины подлежат выбраковке и обеззараживанию путем кипячения в течение 15 минут или

путем обработки дезинфицирующим средством. Аналогичным образом обеззараживают флаконы из-под вакцины, шприцы и иглы.

Утилизация обеззараженной вакцины не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9. Фармакотерапевтическая группа: иммунобиологический лекарственный препарат для ветеринарного применения (вакцина).

10. Вакцина АйФлу ND+H9 вызывает формирование иммунного ответа у птицы к возбудителям ньюкаслской болезни и гриппа птиц подтипа H9 через 21 день после однократной вакцинации, который сохраняется в течение 2-6 месяцев.

Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

11. Вакцина предназначена для профилактики ньюкаслской болезни и гриппа птиц подтипа H9 в племенных и товарных птицеводческих хозяйствах различного направления выращивания.

12. Запрещено прививать клинически больных и/или ослабленных птиц.

13. При проведении вакцинации необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами ветеринарного назначения.

Все лица, участвующие в проведении вакцинации, должны быть одеты в спецодежду (резиновые сапоги, халат, брюки, головной убор, резиновые перчатки) и обеспечены индивидуальными средствами защиты (очки закрытого типа). В местах работы должна быть аптечка доврачебной помощи.

При попадании вакцины на кожу и/или слизистые оболочки, их рекомендуется промыть большим количеством воды.

При случайном введении следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Не рекомендуется применять вакцину курам-несушкам менее чем за 14 - 21 день до начала яйцекладки. Применение лекарственного препарата курам-несушкам в период яйцекладки возможно в условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации. В этом случае у кур-несушек возможно уменьшение яичной продуктивности, вызванное стрессом при проведении процедуры вакцинации. Решение о проведении вакцинации кур-несушек в период яйцекладки должно быть принято на основании оценки соотношения пользы к возможному риску.

15. Вакцинации подлежат цыплята любого возраста и взрослая птица не позднее, чем за 14-21 день до начала яйцекладки.

Вакцину вводят подкожно в область средней трети шеи или внутримышечно в область грудной мышцы с соблюдением правил асептики в следующих дозировках:

- цыплят в возрасте до 14 дней вакцинируют в дозе 0,2 мл на птицу, продолжительность иммунитета составляет 2 месяца;

- цыплят старше 14-дневного возраста вакцинируют в дозе 0,5 мл на птицу, продолжительность иммунитета составляет 5 месяцев;

- курам-несушкам вводят вакцину в дозе 0,5 мл на птицу не позднее чем за 14-21 день до начала яйцекладки, продолжительность иммунитета составляет 6 месяцев.

При необходимости проводят ревакцинацию поголовья, а график последующих ревакцинаций формируют с учетом эпизоотической ситуации в хозяйстве.

Перед применением вакцину предварительно прогревают на водяной бане при температуре не выше 35°C в течение 30 минут, либо выдерживают в течение 6-9 часов при температуре 20-25°C. Перед применением и во время проведения иммунизации флакон с вакциной периодически встряхивают для восстановления однородности эмульсии.

Для вакцинации используют шприцы-автоматы и иглы, которые стерилизуют кипячением в течение 15-20 мин. Допускается использование одноразовых шприцов. Место введения вакцины обрабатывают 70% раствором этилового спирта или другим дезинфицирующим средством.

16. При применении вакцины АйФлу ND+H9 в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.

17. Симптомов проявления ньюкаслской болезни и гриппа птиц подтипа H9 или других патологических признаков при передозировке вакцины не установлено.

18. Взаимодействие с другими лекарственными средствами и (или) кормами не установлено. Не рекомендуется смешивать вакцину в одном шприце с другими иммунобиологическими и лекарственными препаратами.

19. Особенности поствакцинальной реакции при иммунизации не установлено.

20. Следует избегать нарушений схемы (сроков) применения вакцины, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики ньюкаслской болезни и гриппа птиц подтипа H9.

21. Мясо, продукты убоя и яйцо, полученные от вакцинированной птицы используют без ограничений. При убое тушки птицы подлежат тщательной ветеринарно-санитарной экспертизе, и, при обнаружении на месте введения вакцины признаков воспаления или не рассосавшегося адьюванта, подлежат выбраковке и утилизации.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения:

«YEBIO BIOENGINEERING CO., LTD OF QINGDAO», КНР

Наименование, адрес организации, уполномоченной владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя

ООО «Радиовет», Российская Федерация, 121609, г. Москва, Осенний б-р, д. 23.