



ИНСТРУКЦИЯ по ветеринарному применению лекарственного препарата **Тилвалозин тартрат премикс 20%**

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата: Тилвалозин тартрат премикс 20% (Tylvalosin tartrate premix 20%).

Международное непатентованное название: тилвалозин.

2. Лекарственная форма: порошок для орального применения.

Тилвалозин тартрат премикс 20% в 1 г содержит в качестве действующего вещества тилвалозин (в форме тартрата) - 200 мг, а в качестве вспомогательных веществ лимонную кислоту безводную, вкусоароматическую добавку и лактозу.

3. По внешнему виду препарат представляет собой жёлто-коричневый порошок.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения - 2 года с даты производства.

Запрещается использовать лекарственный препарат по истечении срока годности.

4. Тилвалозин тартрат премикс 20% выпускают расфасованным по 1 кг в пакетах из алюминиевой фольги; по 25 кг в полиэтиленовых мешках, вложенных в композитные пропиленово-бумажные мешки.

Каждую потребительскую упаковку с препаратом снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от влаги и прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 5°C до 30°C.

6. Лекарственный препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается по рецепту на лекарственный препарат или требованию ветеринарной организации.

II. Фармакологические (биологические) свойства

9. Тилвалозин тартрат премикс 20% относится к антибактериальным лекарственным препаратам группы макролидов.

10. Тилвалозин, входящий в состав лекарственного препарата, активен в отношении грамположительных микроорганизмов, включая *Clostridium pefringens*, *Brachyspira hyodysenteriae*, *Brachyspira pilosicoli*, а также некоторых грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Lawsonia intracellularis*, *Ornithobacterium rhinotracheale* и микоплазм (*Mycoplasma gallicepticum*, *Mycoplasma synoviae*, *Mycoplasma meleagridis*, *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Mycoplasma hyosynoviae* и *Mycoplasma hyorhinis*). Механизм бактериостатического действия тилвалозина заключается в связывании с рибосомой 50S, подавлении синтеза белка в микробной клетке на рибосомальном уровне.

После перорального введения тилвалозин быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте и легко проникает в большинство органов и тканей организма животного, достигая

максимальной концентрации в сыворотке крови через 1-3 часа, удерживаясь на терапевтическом уровне в течение 15-18 часов. Выводится тилвалозин из организма преимущественно с фекалиями и частично с мочой в неизменном виде и в виде метаболитов. Основным метаболитом является 3-ацетилтилозин, который также обладает значительной микробиологической активностью.

По степени воздействия на организм Тилвалозин тартрат премикс 20% относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Тилвалозин тартрат премикс 20% применяют сельскохозяйственной птице (цыплятам-бройлерам, ремонтному молодняку кур и индеек) и свиньям с лечебной целью при заболеваниях бактериальной и микоплазменной этиологии органов дыхания и пищеварительного тракта, вызванных микроорганизмами, чувствительными к тилвалозину.

12. Противопоказанием к применению препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата, выраженные нарушения функций печени и/или почек. Запрещается применение препарата курам-несушкам и ремонтному молодняку кур менее чем за 2 недели до начала яйцекладки, ввиду накопления тилвалозина в яйцах.

13. При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

Любям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Тилвалозин тартрат премикс 20%. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Применение препарата беременным и лактирующим самкам возможно по назначению ветеринарного врача, если ожидаемая польза превышает потенциальный риск.

15. Тилвалозин тартрат премикс 20% применяют индивидуально или групповым способом в смеси с кормом или с водой для поения в следующих суточных дозах:

- свиньям при энзоотической пневмонии – 10,0-12,5 мг лекарственного препарата на 1 кг массы тела (что эквивалентно 2,0-2,5 мг тилвалозина на 1 кг живой массы) или 0,20-0,25 кг лекарственного препарата на 1 т корма в течение 5-7 дней;

- свиньям при илеите и дизентерии - 20-25 мг лекарственного препарата на 1 кг массы тела (что эквивалентно 4,0-5,0 мг тилвалозина на 1 кг живой массы) или 0,40-0,50 кг лекарственного препарата на 1 т корма в течение 5-7 дней;

- цыплятам-бройлерам и ремонтному молодняку кур и индеек - 75-125 мг лекарственного препарата на 1 кг массы птицы (что эквивалентно 15-25 мг тилвалозина на 1 кг живой массы) или 0,50-0,75 кг лекарственного препарата на 1 т корма в течение 5-7 дней.

При групповом способе в период лечения свиньи и сельскохозяйственная птица должны получать только воду или корма, содержащие лекарственный препарат. Лечебный раствор готовят ежедневно.

Количество препарата рассчитывают исходя из фактического потребления корма или воды в течение суток.

16. Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. В случае появления аллергических

реакций использование препарата прекращают и назначают антигистаминные средства и симптоматическую терапию.

17. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата могут проявляться нарушением функций желудочно-кишечного тракта.

18. Тилвалозин тартрат премикс 20% не следует применять одновременно с другими макролидами, полиэфирными ионофорами и антибиотиками аминогликозидного ряда в связи с возможным взаимным снижением противомикробной активности.

19. Особенности действия препарата при первом применении и при его отмене не установлено.

20. Следует избегать пропусков при применении очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.

21. Убой свиней на мясо разрешается не ранее, чем через 2 суток, а птицы - не ранее, чем через 1 сутки после последнего применения препарата. Мясо животных и птицы, вынужденно убитых до истечения установленного срока, может быть использовано в корм пушным зверям.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения:

«Zhumadian Huazhong Chia Tai Co., Ltd.», КНР

Наименование, адрес организации, уполномоченной владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя

ООО «Радиовет», Российская Федерация, 121609, г. Москва, Осенний б-р, д. 23.