

ИНСТРУКЦИЯ



по ветеринарному применению
лекарственного препарата
Алтизал[®] 1000

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: Алтизал[™] 1000 (Altizal 1000).

Международное непатентованное наименование: тилозин.

2. Лекарственная форма: микрогранулированный порошок для перорального применения.

1,1 г Алтизал[™] 1000 в качестве действующего вещества содержит 1,1 г тилозина тартрата, что соответствует 1,0 г тилозина.

3. По внешнему виду препарат представляет собой микрогранулированный порошок от белого до бледно-желтого цвета. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 3 года со дня производства. После первого вскрытия упаковки годен в течение 3 месяцев при соблюдении условий хранения в пределах основного срока годности. В растворе готового препарата – 48 часов с момента приготовления раствора.

Лекарственный препарат запрещается применять по истечении срока годности.

4. Алтизал[™] 1000 выпускают расфасованным в пакеты-саше из алюминиевой фольги многоразового вскрытия по 0,55 и 1,1 кг. Каждую единицу упаковки снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят Алтизал[™] 1000 в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0°C до 25°C. Допускается кратковременное (до 30 суток) транспортирование препарата при температуре от минус 20°C до 40°C всеми видами транспортных средств, обеспечивающими надежную сохранность и целостность упаковочной тары.

6. Лекарственный препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: по рецепту или требованию ветеринарной организации.

II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа лекарственного препарата для ветеринарного применения: группа макролиды.

10. Тилозина тартрат обладает широким спектром бактерицидного действия, активен в отношении некоторых грамположительных микроорганизмов, включая *Arcanobacterium (Corynebacterium)*, *Clostridium spp.*, *Streptococci*, *Staphylococci*, и грамотрицательных микроорганизмов, включая *Pasteurellau*, *Lawsonia intracellularis.*, *Chlamydia spp.*, *Spirocheta spp.*, *Escherichia coli.*, *Haemophilus spp.*, *Leptospira spp.*, а также *Mycoplasma* и *Brachyspira (Treponema) hyodysenteriae*

Механизм бактериостатического действия тилозина заключается в подавлении синтеза белка на рибосомальном уровне.

При пероральном введении антибиотик быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта в кровь и проникает практически во все органы и ткани организма. Наиболее высокая концентрация лекарственного средства достигается в легких, печени, молочных железах и почках. Терапевтическая концентрация антибиотика после однократного применения сохраняется в организме в течение 15-24 часов. Тилозин выводится из организма преимущественно с фекалиями, в меньшей степени - через почки и с молоком.

Алтизал™ 1000 по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по СГС).

III. Порядок применения

11. Алтизал™ 1000 применяют для лечения сельскохозяйственной птицы и свиней при желудочно-кишечных и респираторных бактериальных инфекциях, вызванных возбудителями, чувствительными к тилозину.

12. Противопоказанием к применению Алтизал™ 1000 является повышенная индивидуальная чувствительность животного к тилозину. Запрещается применять препарат курам-несушкам, яйца которых предназначены в пищу людям.

13. При работе с Алтизал™ 1000 следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. Людям с гиперчувствительностью к компонентам лекарственного препарата следует избегать прямого контакта с Алтизал™ 1000. При работе с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. После работы с лекарственным препаратом вымыть руки с мылом. Пустые флаконы и канистры из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми

оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Особенности применения Алтизал™ 1000 у беременных животных, у животных в период лактации и у потомства животных не установлено.

15. Алтизал™ 1000 применяют перорально внутрь с водой для поения.

С лечебно-профилактической целью Алтизал™ 1000 назначают курам и индейкам в следующие периоды выращивания:

Вид и группа птиц	Возраст птицы, сутки				
	1-3	1-5	28-29	56-57	140-141
Племенная птица		+	+	+	+
Промышленное стадо	+		+		
Индейки			+		
Цыплята-бройлеры	+		+		

Индейки: 75 - 100 мг тилозина на кг массы животного в день (соответствуют 82.5 - 110 мг Алтизал™ 1000 на кг массы животного), в течение 3-5 дней.

Цыплята-бройлеры и племенная птица:

- для лечения хронических респираторных заболеваний: 75 - 100 мг тилозина на кг массы животного в день (соответствуют 82.5 - 110 мг Алтизал™ 1000 на кг массы животного), в течение 3-5 дней.

- для лечения некротического энтерита: 20 мг тилозина на кг массы животного в день (соответствуют 22 мг Алтизал™ 1000 на кг массы животного), в течение 3 дней.

Свиньи:

- для лечения энзоотической пневмонии: 20 мг тилозина на кг массы животного в день (соответствуют 22 мг Алтизал™ 1000 на кг массы животного), в течение 10 дней.

- для лечения илеита или пролиферативного аденоматоза свиней:

5-10 мг тилозина на кг массы животного в день (соответствуют 5,5 – 11,0 мг Алтизал™ 1000 на кг массы животного), в течение 7 дней.

В период лечения свиньи и птица не должны получать другого источника питья, кроме воды с лекарственным препаратом. Перед применением рекомендованную дозу препарата растворяют в небольшом количестве воды (воду добавляют к грануляту), а затем разводят с водой до необходимой концентрации.

Для приготовления раствора препарата в воде необходимо учитывать вес животного и суточное потребление воды. Потребление воды зависит от таких факторов, как возраст, состояние здоровья, порода, система выращивания. Для точного дозирования препарата может использоваться следующая формула:

$$\frac{\text{.....мг тилозина} \times \text{средний вес группы (кг) подлежащей лечению}}{\text{кг живого веса / день} \times \text{средний расход питьевой воды / на группу (л)}} = \text{...мг тилозина / на 1 л питьевой воды}$$

16. Побочных явлений и осложнений при применении Алтизал™ 1000 в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При применении лекарственного препарата у свиней возможны аллергические реакции на тилозин, проявляющиеся в виде легкого отека прямой кишки, эритемы, зуда и респираторных явлений, которые быстро проходят после прекращения применения лекарственного препарата. Если в течение 2-3 дней не произойдет заметного клинического улучшения, рекомендуется провести повторную проверку чувствительности микроорганизмов, выделенных от больных животных и птицы, к тилозину или заменить Алтизал™ 1000 на другой антибактериальный препарат.

17. Симптомы передозировки у животных могут проявляться в виде нарушения функции желудочно-кишечного тракта. При 5-и кратном увеличении максимальной дозы симптомов отравления не выявлено.

18. Лекарственные взаимодействия не установлены.

19. Особенности действия при первом приеме препарата и при его отмене не установлено.

20. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. При пропуске одной или нескольких доз лекарственного препарата курс применения необходимо возобновить в предусмотренных дозировках и схеме применения.

21. Убой свиней и птицы на мясо разрешается не ранее, чем через 5 суток после последнего применения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения установленного срока, может быть использовано в корм пушным зверям.

Организация-разработчик: ALPOVET LTD, Кипр.

Произведено: по заказу ALPOVET LTD, Кипр.